

Alla prevenzione delle complicanze gravi del tratto gastrointestinale superiore:

- in trattamento cronico con farmaci antiinfiammatori non steroidei
- in terapia antiaggregante con ASA a basse dosi

purché sussista una delle seguenti condizioni di rischio:

- storia di pregresse emorragie digestive o di ulcera peptica non guarita con terapia eradicante
- concomitante terapia con anticoagulanti o cortisonici
- età avanzata

**Principio attivo: DICLOFENAC/MISOPROSTOLO**

**Dose/specialità:**

- **200 mcg + 50 mg 30 cpr:** Arrotec, Misofenac
- **200 mcg + 75 mg 30 cpr:** Arrotec, Misofenac

**Principio attivo: ESOMEPRAZOLO**

**Dose/specialità:**

- **20 mg 14 cpr gastrores:** Axagon, Esopral, Lucen, Nexium
- **40 mg 14 cpr gastrores:** Axagon, Esopral, Lucen, Nexium

**Principio attivo: LANSOPRAZOLO**

**Dose/specialità:**

- **15 mg 14 cpr orodispers:** Lansox, Limpidex, Zoton
- **15 mg 14 cps:** Ermes, Frilans, Lansoprazolo Actavis, Lansoprazolo Almus, Lansoprazolo Alter, Lansoprazolo Doc, Lansoprazolo Eg, Lansoprazolo Hexal, Lansoprazolo Merck Generics, Lansoprazolo Pensa, Lansoprazolo Pliva, Lansoprazolo Ranbaxy, Lansoprazolo Ratiopharm, Lansoprazolo Sandoz, Lansoprazolo Teva, Lansoprazolo Winthrop, Lansox, Limpidex, Peptirex, Pergastid, Zoton
- **30 mg 14 cpr orodispers:** Lansox, Limpidex, Zoton
- **30 mg 14 cps:** Ermes, Frilans, Lansoprazolo Actavis, Lansoprazolo Almus, Lansoprazolo Alter, Lansoprazolo Doc, Lansoprazolo Eg, Lansoprazolo Hexal, Lansoprazolo Merck Generics, Lansoprazolo Pensa, Lansoprazolo Pliva, Lansoprazolo Ranbaxy, Lansoprazolo Ratiopharm,

Lansoprazolo Sandoz, Lansoprazolo Teva, Lansoprazolo Winthrop, Lansox, Limpidex, Peptirex, Pergastid, Zoton

**Principio attivo: MISOPROSTOLO**

**Dose/specialità:**

- **200 mcg 50 cpr:** Cytotec, Misodex

**Principio attivo: OMEPRAZOLO**

**Dose/specialità:**

- **10 mg 14 cpr gastrores:** Alsidol, Omeprazolo Fidia, Omeprazolo Merck Generics, Omeprazolo Pliva, Omeprazolo Ranbaxy
- **10 mg 14 cps gastrores:** Nansen, Omeprazolo Alter, Omeprazolo Angenerico, Omeprazolo Doc, Omeprazolo Eg, Omeprazolo Hexal, Omeprazolo Pensa, Omeprazolo Ratiopharm, Omeprazolo Sandoz, Omeprazolo Teva, Zaprol
- **10 mg 14 cps ril mod:** Antra, Losec, Mepral, Omeprazen
- **20 mg 14 cpr gastrores:** Alsidol, Omeprazolo Fidia, Omeprazolo Merck Generics, Omeprazolo Pliva, Omeprazolo Ranbaxy
- **20 mg 14 cps gastrores:** Anadir, Arpezol Cletus, Komazol, Kruxagon, Limnos, Maricrio, Nansen, Omeprazolo Actavis, Omeprazolo Almus, Omeprazolo Alter, Omeprazolo Angenerico, Omeprazolo Doc, Omeprazolo Eg, Omeprazolo Hexal, Omeprazolo Pensa, Omeprazolo Ratiopharm, Omeprazolo Sandoz, Omeprazolo Sofar, Omeprazolo Teva, Omeprazolo Winthrop, Omolin, Protec, Ulcezol, Zaprol
- **20 mg 14 cps ril mod:** Antra, Losec, Mepral, Omeprazen

**Principio attivo: PANTOPRAZOLO\***

**Dose/specialità:**

- **20 mg 14 cpr gastrores:** Pantecta, Pantopan, Pantorc, Peptazol
- **40 mg 14 cpr gastrores:** Pantecta, Pantopan, Pantorc, Peptazol

**Background**

È noto come il trattamento cronico con i FANS possa determinare un aumentato rischio di ulcera peptica e delle sue complicanze gravi (emorragia, perforazione, ostruzione). Il rischio di ospedalizzazione per una com-

\* Solo le confezioni di pantoprazolo a basso dosaggio possono essere prescritte in Nota 1.

plicanza grave è stimato fra l'1 e il 2% per anno, ed aumenta fino a 4-5 volte nelle categorie a rischio specificate nella nota limitativa. Sulla base di studi clinici randomizzati e osservazionali anche l'uso di anticoagulanti e l'età avanzata (65-75 anni) sono risultate essere condizioni predisponenti al rischio di complicanze gravi del tratto gastrointestinale superiore. Pertanto tali condizioni devono essere considerate fattori suggestivi di popolazioni a maggior rischio ma non raccomandazioni tassative per trattare, ad esempio, tutti gli anziani o tutti coloro che assumono anticoagulanti.

Data la rilevanza clinica della tossicità gastroduodenale indotta dai FANS, numerosi sono stati inoltre gli studi che hanno valutato l'efficacia di una "gastroprotezione" utilizzando accanto agli inibitori di pompa anche gli analoghi delle prostaglandine (misoprostolo) e gli anti secretivi (H2 antagonisti).

I pazienti in trattamento combinato, ASA e clopidogrel, per i quali è sconsigliata la somministrazione di un inibitore della pompa protonica, possono effettuare la prevenzione delle complicanze gravi del tratto intestinale superiore con l'assunzione di misoprostolo. In ogni caso debbono essere rispettate le condizioni di rischio nel box soprariportato.

## Evidenze disponibili

### Misoprostolo

Risulta ancor oggi l'unico farmaco per il quale esistono dati convincenti che ne dimostrano l'efficacia nel ridurre l'incidenza delle complicanze gravi (emorragie, perforazioni e ostruzione pilorica) della gastropatia da FANS. Lo studio (MUCOSA) di grandi dimensioni (8.853 pazienti) ha infatti documentato una riduzione del 40% di dette complicanze rispetto al placebo. Una metanalisi di 24 studi che ha valutato l'efficacia del misoprostolo non in base alla riduzione delle complicanze ma solo in base alla riduzione dell'incidenza di ulcere gastriche o duodenali diagnosticcate endoscopicamente ha confermato detta efficacia: (NNT = 8) per prevenire un'ulcera gastrica e (NNT = 30) per prevenire un'ulcera duodenale.

Il misoprostolo somministrato alla dose di 800 µg ha però una tollerabilità scarsa (dispepsia, dolore addominale, diarrea) e nello studio MUCOSA i pazienti che sospendevano il trattamento per disturbi gastrointestinali erano più numerosi fra quelli trattati con misoprostolo più FANS (27,4%) che fra quelli trattati con FANS più placebo (20,1% p<0,001).

### Inibitori della pompa protonica

Numerosi studi hanno dimostrato che nei soggetti

trattati con FANS, dosi standard di inibitori della pompa protonica riducono significativamente l'incidenza di ulcere gastriche e duodenali diagnosticcate all'endoscopia rispetto al placebo. Due di essi meritano particolare attenzione. Nel primo omeprazolo è stato confrontato con ranitidina e, nel secondo, con misoprostolo in due *trial* con uguale disegno sperimentale. In tutti e due gli studi (ASTRONAUT e OMNIUM) venivano valutati soggetti che a seguito della terapia con FANS presentavano una ulcera peptica o almeno 10 erosioni gastriche o duodenali. Ciascuno dei due *trial* esaminava due fasi: a) la guarigione delle lesioni da FANS già presenti; e b) la prevenzione della ricomparsa delle lesioni durante ritrattamento con i FANS. In entrambe le fasi la terapia con omeprazolo si è dimostrata più efficace del farmaco di confronto (rispettivamente, ranitidina e misoprostolo) sia nel guarire le ulcere sia nel prevenire le recidive. Detti risultati vanno però valutati con prudenza in quanto entrambi gli studi presentano limiti metodologici rilevanti quali: 1) la dimostrazione di maggiore efficacia è basata su parametri surrogati, infatti gli studi hanno utilizzato come "end-point" terapeutico la riduzione del numero di ulcere endoscopiche e dei sintomi dispeptici e non delle complicanze gravi che sono il parametro clinico più rilevante cui mira la profilassi farmacologica: non è cioè la stessa cosa prevenire un'ulcera visibile alla endoscopia routinaria in uno studio clinico e prevenire una complicanza grave (emorragia, perforazione, ostruzione); 2) le dosi utilizzate con i farmaci di riferimento (400 µg/d per il misoprostolo e 300 mg/d per la ranitidina) sono probabilmente inadeguate; infine, 3) è mancata soprattutto una attenta considerazione alla presenza o meno nei pazienti trattati di una infezione da *Helicobacter pylori*. Lo stato di portatore o meno di una tale infezione può, infatti, avere grande rilevanza. Una recente metanalisi condotta su 16 studi dimostra, infatti, in modo convincente come sia l'infezione da *Helicobacter pylori* sia l'impiego di FANS tradizionali possano aumentare il rischio di causare un'ulcera peptica o un sanguinamento gastrico in modo indipendente, avendo un effetto sinergico nell'aggravare il rischio di ulcera peptica e sanguinamento quando entrambi i fattori di rischio sono presenti nello stesso paziente. La superiore efficacia dell'inibitore di pompa rispetto a misoprostolo e a dosi usuali di H2 bloccanti nel prevenire le ulcere da FANS potrebbe cioè essere in parte solo apparente e dovuta a una diversa distribuzione dei pazienti con infezione nella popolazione studiata.

## Particolari avvertenze

L'importanza dell'infezione da *H. pylori* nella strategia di prevenzione del sanguinamento gastrico causato dai FANS tradizionali e dall'ASA a basso dosaggio è dimostrato da uno studio recente che ha rilevato come nei pazienti con infezione da *Helicobacter pylori* e una storia di sanguinamento gastrico, l'eradicazione dell'infezione da *Helicobacter pylori* risulti equivalente all'omeprazolo nel prevenire una recidiva del sanguinamento gastrico nei pazienti che assumono ASA a basse dosi (probabilità di recidiva del sanguinamento a 6 mesi 1,9% con eradicazione e 0,9% con omeprazolo). Mentre nei pazienti che assumono naprossene al posto dell'ASA a basse dosi l'inibitore di pompa risulta più efficace della semplice eradicazione (probabilità di recidiva del sanguinamento a 6 mesi 18,8% con l'eradicazione e 4,4% con omeprazolo).

Nei pazienti con storia di sanguinamento gastrico e che devono continuare una profilassi secondaria con ASA a basse dosi l'eradicazione dell'infezione probabilmente si pone perciò come strategia profilattica più conveniente della somministrazione di un inibitore di pompa. Non è chiaro se l'eradicazione vada comunque eseguita in tutti i pazienti infetti che fanno uso cronico di FANS tradizionali. Una metanalisi recente ha dimostrato che il rischio emorragico da ASA impiegato come antiaggregante è assai basso (una emorragia ogni 117 pazienti trattati con 50-162 mg/die di ASA per una durata media di 28 mesi). Pertanto, una gastroprotezione farmacologica generalizzata non è giustificata. I *trial* considerati nella metanalisi escludevano però i pazienti ad alto rischio emorragico. In mancanza di dati relativi a questi pazienti, se si estrapola ad essi l'aumento di emorragie o ulcere da FANS nei soggetti a rischio (4-5 volte quello di base), la gastroprotezione nei soggetti a rischio emorragico trattati "long-term" con ASA potrebbe essere giustificata specie in presenza dei fattori di rischio più rilevanti (emorragia pregressa e pazienti in trattamento con anticoagulanti e cortisonici). Nei pazienti con infezione da *Helicobacter pylori* risulta indicata l'eradicazione. Non è invece appropriato l'uso di preparazioni "gastroprotette" o tamponate di ASA, che hanno un rischio emorragico non differente da quello dell'ASA standard. Gli H2-inibitori non sono stati inclusi tra i farmaci indicati per la prevenzione e il trattamento del danno gastrointestinale da FANS perché in dosi standard non riducono significativamente l'incidenza delle ulcere gastriche, che sono le più frequenti fra quelle da FANS anche se hanno efficacia pressoché uguale a quella del misoprostolo sulle ulcere duodena-

li. Una revisione non sistematica del danno gastrointestinale da FANS non raccomanda gli H2 – inibitori per la prevenzione dei danni gastroenterici da FANS; li ammette per la terapia delle ulcere previa sospensione dei FANS, ma non se si seguivano i FANS. I dati clinici citati non possono essere applicati ai COXIB. Va segnalato come in uno studio in pazienti con storia di sanguinamento gastrico recente, il trattamento per sei mesi con omeprazolo più diclofenac si sia dimostrato egualmente efficace rispetto al celecoxib nel prevenire la ricorrenza del sanguinamento gastrico. Al momento vi sono dati preliminari derivati da un solo RCT di modeste dimensioni che documenta l'efficacia di un inibitore di pompa nel ridurre il danno gastrico da COXIB.

## Bibliografia

- Chan FKL, et al. Celecoxib versus diclofenac and omeprazole in reducing the risk of recurrent ulcer bleeding in patients with arthritis. *N Engl J Med* 2002; 347: 2104-10.
- Chan FKL, et al. Preventing recurrent upper gastrointestinal bleeding in patients with *Helicobacter pylori* infection who are taking low-dose aspirin or naproxen. *N Engl J Med* 2001; 344: 967-73.
- Cullen D, et al. Primary gastroduodenal prophylaxis with Omeprazole for Nonsteroidal Anti-inflammatory Drug users. *Aliment Pharmacol Ther* 1998; 12: 135-40.
- Daneshmand TK, et al. Abolition by Omeprazole of Aspirin-induced gastric mucosal injury in man. *Gut* 1990; 31: 514-7.
- Derry S, et al. Risk of gastrointestinal hemorrhage with long term use of aspirin: meta-analysis. *BMJ* 2000; 321: 1183-7.
- Ekstrom P, et al. Prevention of peptic ulcer and dyspeptic symptoms with Omeprazole in patients receiving Nonsteroidal Anti-inflammatory Drug continuous therapy. A nordic multicentre study. *Scand J Gastroenterol* 1996; 31: 753-8.
- Feldman M. Peptic ulcer disease. In: Dale DC, Federman DD eds. *Scientific American Medicine*, Section 4, Gastroenterology II, 2000: 2-3.
- Graham DY et al. Ulcer prevention in long-term users of Nonsteroidal Antinflammatory Drugs. *Arch Intern Med* 2002; 162: 169-75.
- Graham DY. Critical effect of *Helicobacter pylori* infection on the effectiveness of omeprazole for prevention of gastric or duodenal ulcers among chronic NSAID users. *Helicobacter* 2002; 7: 1-8.
- Graham DY. NSAIDs, *Helicobacter pylori* and Pandora Box. *N Engl J Med* 2002; 347: 2162-64.
- Hawkey CJ, et al. Omeprazole compared with Misoprostol for ulcers associated either Nonsteroidal Antiinflammatory Drugs. *N Engl J Med* 1998; 338: 727-34.
- Jia-Qing et al. Role of *Helicobacter pylori* infection and non-steroidal anti-inflammatory drugs in peptic ulcer disease : a meta-analysis. *Lancet* 2002; 359: 14-22.
- Kelly YP et al. Risk of aspirin – associated major upper gastrointestinal bleeding with enteric-coated or buffered products. *Lancet* 1996; 384: 1413-6.
- Koch M et al. Prevention of Nonsteroidal Anti-inflammatory drugs-induced gastrointestinal mucosal injury. A meta-analysis

- of randomised controlled clinical trial. Arch Intern Med 1996; 156: 2321-32.
- Lanza FL. A guideline for the treatment and prevention of NSAID-induced ulcers. Am J Gastroenterol 1998; 93: 2037-46.
  - Silverstein et al. Misoprostol reduces serious gastrointestinal complications in patients with rheumatoid arthritis receiving Nonsteroidal Anti-inflammatory drugs. A. randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Ann Intern Med 1995; 123: 241-9.
  - Wolfe MM et al. Gastrointestinal toxicity of Non-steroidal Anti-inflammatory Drugs. N Engl J Med 1999; 340: 1888-99.
  - Yeomans ND et al. A comparison of Omeprazole with Ranitidine for ulcers associated with Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs. N Engl J Med 1998; 338: 719-26.
  - Chan FKL et al. Combination of a cyclo-oxygenase-2 inhibitor and a proton-pump inhibitor for prevention of recurrent ulcer bleed-

ing in patients at very high risk: a double-blind, randomised trial. Lancet 2007; 369: 1621-6.

- Heidelbaugh JJ, Goldberg KL, Inadomi JM. Overutilization of proton pump inhibitors: a review of costeffectiveness and risk [corrected] Am J Gastroenterol. 2009 Mar; 104:27-32.
- Lanza FL, Chan FK, Quigley EM. Practice Parameters Committee of the American College of Gastroenterology. Guidelines for prevention of NSAID-related ulcer complications. Am J Gastroenterol. 2009;104:728-38.
- Schlansky B, Hwang JH. Prevention of nonsteroidal anti-inflammatory drug-induced gastropathy. J Gastroenterol. 2009; 19:44-52.
- Gilard M, Arnaud B, Cornily JC, Le Gal G, Licut K, Le Calvez G, et al. Influence of omeprazole on the antiplatelet action of clopidogrel associated with aspirin. The randomized, double-blind OCLA (Omeprazole Clopidogrel Aspirin) study. J Am Coll Cardiol 2008;51(3):256-60.

## NOTA 2 - La prescrizione a carico del SSN è limitata ai pazienti affetti da:

- Cirrosi biliare primitiva
- Colangite sclerosante primitiva
- Colestasi associata alla fibrosi cistica o intraepatica familiare
- Calcolosi colesterinica

### **Principio attivo: ACIDO CHENOURSO-DESOSSICOLICO**

#### **Dose/specialità:**

- **250 mg 30 cps:** Bilenor

### **Principio attivo: ACIDO TAUROURSO-DESOSSICOLICO**

#### **Dose/specialità:**

- **150 mg 20 cps:** Tauro
- **250 mg 20 cps:** Tauro

### **Principio attivo: ACIDO URISODESSICOLICO**

#### **Dose/specialità:**

- **150 mg 20 cpr:** Ac Ursodesossicolico Merck Generics, Desoxil, Litursol, Urdes, Ursacol, Ursodamor
- 150 mg 20 cps:** Deursil, Fraurs, Ursobil, Ursoflor, Ursolisin
- **225 mg 20 cpr gastrores:** Urdes
- 225 mg 20 cps ril mod:** Deursil Mite, Ursilon Retard
- **250 mg 20 cps:** Ursobil
- **300 mg 20 cpr:** Ac Ursodesossicolico Merck Generics, Ac Ursodesossicolico Ratiopharm, Desoxil, Litoff, Litursol, Urdes, Ursacol, Ursobil, Ursodamor
- 300 mg 20 cps:** Ac Ursodesossicolico Actavis, Ac Ursodesossicolico Angenerico, Ac Ursodesossicolico Doc,

Ac Ursodesossicolico Dorom, Ac Ursodesossicolico Eg, Acido Ursodesossicolico Pliva, Ac Ursodesossicolico Teva, Ac Ursodesossicolico Winthrop, Biliepar, Desocol, Deursil, Fraurs, Ursilon, Ursoflor, Ursolisin

• **450 mg 20 cpr:** Desoxil

**450 mg 20 cpr gastrores:** Urdes

**450 mg 20 cpr ril mod:** Ac Ursodesossicolico Eg, Ac Ursodesossicolico Ratiopharm, Litoff, Ursoflor R

**450 mg 20 cps:** Ac Ursodesossicolico Doc, Ac Ursodesossicolico Winthrop

**450 mg 20 cps ril mod:** Ac Ursodesossicolico Dorom, Acido Ursodesossicolico Pliva, Ac Ursodesossicolico Teva, Deursil, Dissolursil, Litursol, Ursilon Retard, Ursobil Ht, Ursodiol

• **31,7 mg/ml scir 200 ml:** Ursobil

### **Background**

La presente nota nasce per il fatto che alcuni prodotti a base di acidi biliari riportano "indicazioni minori" quali le "dispepsie biliari". Tali indicazioni, per il carattere indefinito del disturbo, per la sua limitata rilevanza clinica se isolatamente considerato, oltre che per l'assenza di studi adeguati a supporto di tali indicazioni, non possono essere poste a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Pertanto, **sono rimborsate solo le prescrizioni riferite alle situazioni cliniche indicate nella presente nota.**

### **Evidenze disponibili**

Le prime tre indicazioni si riferiscono a epatopatie croniche nelle quali modificazioni quali-quantitative della